

S-HLR BARN

Hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal

BARN 0-1 ÅR

Medvetslös?



Skapa öppen luftväg Andas?



Ingen eller onormal andning Ge 5 inblåsningar



Inga eller osäkra livstecken Gör HLR 15:2

Djup: 4 cm, takt: 100-120/min




Samordna bröstkompressioner och inblåsningar

BARN 1 ÅR TILL PUBERTET

Medvetslös?



Skapa öppen luftväg Andas?



Ingen eller onormal andning Ge 5 inblåsningar



Inga eller osäkra livstecken Gör HLR 15:2

Djup: 5 cm, takt: 100-120/min



Samordna bröstkompressioner och inblåsningar

Larma larmgrupp
Primärvård, tandvård:
Larma 112
Hämta akututrustning

BARN

När barn drabbas av hjärtstopp beror det oftast på att de inte kunnat andas. Ge därför barnet 5 inblåsningar direkt och starta hjärt-lungräddning.

HLR MED GOD KVALITET:

Hjälp varandra att kontrollera att inblåsningar ger synlig bröstorgshöjning och att bröstkompressionerna utförs på rätt sätt. Minimera alla avbrott i HLR.

ARBETSORDNING VID HJÄRTSTOPP HOS BARN:

Personal 1 - Påbörjar Barn-HLR och tillkallar hjälp
Personal 2 - Larmar och hämtar akututrustning
Personal 3 - Utför HLR tillsammans med personal 1

Om hjärtstartare finns - anslut och följ råd

VUXNA

När vuxna drabbas av plötsligt hjärtstopp beror det oftast på livshotande rytmrubbningar. Starta HLR 30:2. Hämta hjärtstartare, anslut och följ råd."

