

Rättelser kursbok A-HLR barn utgåva 490-43402 Rev G

Detta dokument gäller endast denna utgåva, vid nytryck är dessa fel korrigerade.

Sidan 12

ACVPU-skalan

A – Alert Vaken och reagerar vid kontakt

C - Confusion Konfusorisk

V – Voice Reagerar bara vid tilltal

P – Pain Reagerar bara vid smärtstimulering

U – Unresponsive Reagerar inte vid smärtstimulering

Sidan 17

Följande text har fallit bort:

Vid bevitnat hjärtstopp på barn som är uppkopplat på övervakningsutrustning och där defibrillator finns omedelbart tillgänglig kan man ge tre defibrilleringar direkt efter varandra innan start av HLR.

Sidan 25

Till barn över 1 år använder du ena handens handlov placerad på nedre halvan av bröstbenet, ovan bröstbenspetsen.

Sidan 27

Defibrillera med 4 J/kg, men inte mer än 120 – 200 J.

Sidan 47

Självträning

En halvkroppsdocka med möjlighet till återkoppling av HLR-kvalitet och instruktionsfilmen i HLR barn är ett sätt att hålla de praktiska kunskaperna i HLR-teknik, bröstkompressioner och inblåsningar, aktuella.